

Dane kontaktowe twojego farmaceuty



- Cyklofosfamid to lek przepisywany przez lekarza specjalistę.
- Podczas leczenia należy pić dużo wody, aby jak najczęściej oddawać mocz.
- W przypadku pojawienia się objawów infekcji (np. gorączka, ból gardła), pilnie skonsultuj się z lekarzem

CYKLOFOSFAMID

1. Co to jest cyklofosfamid?

Cyklofosfamid jest to lek stosowany w leczeniu różnych nowotworów. Bywa również stosowany w leczeniu ciężkich objawów niektórych chorób tkanki łącznej (takich jak reumatoidalne zapalenie stawów). W przypadku nowotworów niektóre komórki w ciele rosną i rozmnażają się zbyt szybko. Chemioterapeutyki, takie jak **cyklofosfamid**, działają poprzez zapobieganie namnażaniu się komórek. Zmniejsza to liczbę komórek rakowych. **Cyklofosfamid** jest również lekiem immunosupresyjnym, co oznacza, że hamuje układ odpornościowy organizmu. Z tego powodu jest czasami stosowany w leczeniu ciężkich objawów takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów.

W Polsce występuje pod nazwą handlową Endoxan®, w postaci iniekcji oraz tabletek doustnych.

2. Przed zastosowaniem leku:

Poinformuj lekarza, jeśli:

- Jesteś w ciąży lub karmisz piersią
- Cierpisz na choroby wątroby lub nerek
- Trwa infekcja lub pojawiło się gorsze samopoczucie
- Pojawił się krwiomocz
- Masz cukrzycę
- Masz porfirię
- Przyjmujesz inne leki (także preparaty dostępne bez recepty)
- Kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na lek

3. Jak stosować lek:

- Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania. Ulotka zawiera więcej informacji na temat cyklofosfamidu oraz pełną listę działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas stosowania.
- Cyklofosfamid jest przepisywany przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu nowotworów. Dawka ustalana jest indywidualnie, dlatego należy ten lek stosować ściśle wg zaleceń.
- Tabletkę należy połykać popijając pełną szklanką wody. Nie rozgryzać, nie przełamywać, nie rozgniatać, nie żuć przed połknięciem.

- Lek najlepiej przyjmować rano, godzinę przed posiłkiem. Jeśli po przyjęciu odczuwane są mdłości, można go przyjmować po posiłku.
- W czasie leczenia ważne jest, aby przyjmować duże ilości płynów w celu zwiększenia diurezy. Zminimalizuje to ryzyko rozwoju działań niepożądanych takich jak zapalenie pęcherza.

4. Jak sprawić, by leczenie przynosiło jak najlepsze efekty:

- Regularnie odwiedzaj lekarza, który podczas wizyty sprawdzi postępy w leczeniu i przeprowadzi niezbędne badania.
- W czasie terapii należy stosować skuteczną antykoncepcję, aby uniknąć zajścia w ciążę. Poza tym cyklofosamid negatywnie wpływa na płodność u mężczyzn. Jeśli zamierzasz mieć dzieci w przyszłości, powinieneś poprosić swojego lekarza o poradę dotyczącą planowania rodziny, zanim zaczniesz przyjmować cyklofosamid.
- Podczas przyjmowania cyklofosamid i przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia nie należy szczepić się bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Cyklofosamid obniża odporność organizmu i istnieje ryzyko zakażenia po niektórych szczepionkach.


5. Działania niepożądane:

- **Wysoka temperatura lub objawy infekcji** → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
- **Nudności, mdłości, utrata apetytu** → przyjmuj lek po posiłku, jedz proste posiłki (unikaj bogatych lub pikantnych potraw).
- **Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu** → pij duże ilości płynów i staraj się jak najczęściej oddawać mocz.
- **Krew w moczu** → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
- **Zmniejszona ilość oddawanego moczu, obrzęk kostek** → jak najszybciej skonsultuj się ze swoim lekarzem. Może on przepisać leki, które poradzą sobie z tymi objawami.
- **Wysypka na skórze z plamami lub pęcherzami, czasami z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi** → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Objawy takie mogą świadczyć o rzadkim, ale poważnym schorzeniu skóry.
- **Wypadanie włosów, uderzenia gorąca, utrata masy ciała, duszności, odbarwienia na dłońiach i paznokciach, ból w jamie ustnej, negatywny wpływ na ilość krwinek, brak miesiączki, zmniejszona produkcja spermy** → lekarz porozmawia z Tobą na temat tych problemów.

6. Jak przechowywać lek:

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

Autor: mgr farm. Dorota Pik, mgr farm. Marta Jakubowska
Recenzja: dr n. farm. Piotr Merks, dr n. farm. Elżbieta Wojtasik
Certyfikowane przez komitet naukowy Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF).



5.



6.

